



薬剤部

～情報～

2019年1月



12月の採用薬品 (常備薬品)

セレスターナ配合錠

副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン剤複合剤

セレスタミン配合錠のジェネリック医薬品

ファイザー



【効】 蕁麻疹 (慢性例を除く)、湿疹・皮膚炎群の急性期および急性増悪期、薬疹、アレルギー性鼻炎

【用】 通常成人1回1～2錠を1日1～4回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

ただし、本剤を漫然と使用するべきではない。

【副】 添付文書参照

ヘオーバ錠 50mg

選択的β₃アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

杏林製薬



【効】 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁

【用】 通常、成人には、ビベグロンとして50mgを1日1回食後に経口投与する。

【副】 口内乾燥、便秘、尿路感染、全尿量増加、肝機能異常、CK上昇等。

マックターゼ配合錠

総合消化酵素製剤

沢井製薬



ポリトローゼカプセルが販売中止となるため

【効】 消化異常症状の改善

【用】 通常成人1回2錠を1日3回食後に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】 添付文書参照

12月の採用薬品 (特定個人薬品)

ジクロスター点眼液 0.1%

眼科用非ステロイド性抗炎症剤 ニッテン

【効】 白内障手術時における下記症状の防止:

術後の炎症症状、術中・術後合併症

【用】 【副】 添付文書参照



ビムパット錠 50mg

抗てんかん剤 ユーシービー・ジャパン

【効】 てんかん患者の部分発作 (二次性全般化発作を含む)

【用】 【副】 添付文書参照



12月の採用薬品 (特定個人薬品) つづき

プロノン錠 100mg

不整脈治療剤 アステラス製薬

【効】 下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか

又は無効の場合: 頻脈性不整脈

【用】 【副】 添付文書参照



12月の採用薬品 (院外専用薬品)

バリキサ錠 450mg

抗サイトメガロウイルス化学療法剤 田辺三菱製薬

【効】 下記におけるサイトメガロウイルス感染症:

- (1) 後天性免疫不全症候群
- (2) 臓器移植 (造血幹細胞移植も含む)
- (3) 悪性腫瘍

臓器移植 (造血幹細胞移植を除く) におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制

【用】 【副】 添付文書参照



ナイキサン錠 100mg

鎮痛・抗炎症剤 田辺三菱製薬

【効】 1. 下記疾患の消炎、鎮痛、解熱

関節リウマチ、変形性関節症、痛風発作、強直性脊椎炎、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎、月経困難症、帯状疱疹

2. 外傷後並びに手術後の消炎、鎮痛

3. 歯科・口腔外科領域における抜歯並びに小手術後の消炎、鎮痛

【用】 【副】 添付文書参照



ヒュミラ皮下注 40mgペン0.4mL

ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

アッヴィ合同会社

【効】 【用】 【副】 添付文書参照



12月の削除薬品

ブドウ糖注40%PL「フソー」、ブドウ糖注20%PL「フソー」、セレスタミン配合錠、ポリトローゼカプセル、ヒュミラ皮下注40mgシリンジ