

薬剤部

～情報～

平成29年12月



11月の採用薬品

リリカOD錠25mg・75mg

ファイザー

神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

【効】神経障害性疼痛，線維筋痛症に伴う疼痛

【用】添付文書参照

【副】傾眠，浮動性めまい，浮腫，便秘，悪心，下痢，口渇，転倒・転落等



ポリトローゼカプセル

武田薬品工業

消化酵素製剤

【効】消化異常症状の改善

【用】通常1回1カプセルずつ1日3回食後直ちに経口投与する。なお，年齢・症状により適宜増減する。

【副】過敏症



オーグメンチン配合錠125SS（187.5mg）

グラクソ・スミスクライン

複合抗生物質（クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物）

【効】＜適応菌種＞：添付文書参照

＜適応症＞：表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，子宮内感染，子宮付属器炎，中耳炎

【用】通常成人は，1回2錠，1日3～4回を6～8時間毎に経口投与する。なお，年齢，症状により適宜増減する。

【副】悪心，嘔吐，下痢，腹痛，発疹，蕁麻疹，AST・ALT上昇，好酸球増多等

サリグレンカプセル30mg（特定個人薬）

日本化薬

口腔乾燥症状改善剤

【効】シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善

【用】通常，成人にはセビメリン塩酸塩として1回30mgを1日3回，食後に経口投与する。

【副】嘔気，腹痛，下痢，多汗，嘔吐，血清アミラーゼ上昇等

キシロカインポンプスプレー8% 80g

アスペンジャパン







表面麻酔剤

【効】表面麻酔

【用】リドカインとして，通常成人では8～40mg（1～5回の噴霧）を使用する。なお，年齢，麻酔領域，部位，組織，体質により適宜増減する。



後発医薬品への変更が決定した薬剤

先発品	アダラートCR錠20mg	ガスターD錠20mg	タケプロンOD錠15
後発品	ニフェジピンCR錠 20mg「トーフ」 	ファモチジンOD錠 20mg「トーフ」 	ランソプラゾールOD錠 15mg「トーフ」 
先発品	トランミンカプセル250mg	ミカルデイス錠40mg	クラビット錠500mg
後発品	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーフ」 	テルミサルタン錠 40mg「DSEP」 	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」 

11月の採用薬品（院外処方専用薬品）

ボノテオ錠50mg 骨粗鬆症治療剤

ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g/包 漢方製剤

ムコダイン錠500mg 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カロナール錠500 解熱鎮痛剤

テオロング錠200mg テオフィリン徐放製剤

フスタゾール糖衣錠10mg 鎮咳薬

ザルティア錠5mg 前立腺肥大に伴う排尿障害改善薬

エパデルS900 EPA製剤

ベタニス錠25mg 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ブロン錠100mg 不整脈治療剤

フロリードゲル経口用2% 5g 口腔・食道カンジダ症治療剤

10%イソジンゲル90g包装 殺菌消毒剤

ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン舌下スプレー



採用区分変更薬

エルネオパ1号輸液 1000mL が常備薬品から 用事購入薬品 に変わりました。

11月の削除薬品

リリカカプセル25mg・75mg，エクセラゼ配合カプセル
ロキソニン錠60mg，キシロカイン液4% 20mL，エルネオパ2号輸液 1000mL