



薬剤部

～情報～

2019年3月



2月の採用薬品（常備薬品）

ネスプ注射液 30μg プラシリンジ
複合抗生物質 グラクソ・スミスクライン



【効】腎性貧血
骨髄異形成症候群に伴う貧血
【用】【副】添付文書参照

2月の採用薬品（院外専用薬品）

ドボベツト軟膏、ドボベツトゲル
尋常性乾癬治療剤 レオファーマ



【効】尋常性乾癬
【用】【副】添付文書参照

オノンドライシロップ 10%
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

小野薬品工業



【効】気管支喘息
アレルギー性鼻炎
【用】【副】添付文書参照



白色～微黄色のドライシロップ剤

2月の採用薬品（特定個人薬品）

調剤用バンビタン末
総合ビタミン剤 武田薬品工業



【効】本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）
【用】【副】添付文書参照

フィコンパ錠 2mg
抗てんかん剤 エーザイ



【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法：
部分発作（二次性全般化発作を含む）、強直間代発作
【用】【副】添付文書参照

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒
漢方製剤 ツムラ



【効】比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の
随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）
【用】【副】添付文書参照

2月の採用薬品（特定個人薬品）のつづき

ビタミンK1錠 5mg 「ツルハラ」
ビタミンK1剤 鶴原製薬



【効】1. ビタミンK欠乏症の予防および治療
(1). 各種薬剤（クマリン系抗凝薬、サリチル酸、抗生物質など）投与中におこる低プロトロンビン血症
(2). 胆道および胃腸障害に伴うビタミンKの吸収障害
(3). 新生児の低プロトロンビン血症
(4). 肝障害に伴う低プロトロンビン血症
2. ビタミンK欠乏が推定される出血
【用】【副】添付文書参照

ネオール錠 2.5mg カプセル
免疫抑制剤 ノバルティスファーマ



【効】1. 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制：
腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植
2. 骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制
3. ベーチェット病（眼症状のある場合）、及びその他の非感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分であり、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る）
4. 尋常性乾癬（皮疹が全身の30%以上に及ぶものあるいは難治性の場合）、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬
5. 再生不良性貧血、赤芽球癆
6. ネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイドに抵抗性を示す場合）
7. 全身型重症筋無力症（胸腺摘出後の治療において、ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合）
8. アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）
【用】【副】添付文書参照

2月の区分変更薬品（常備薬品→注文薬品）

レルベア100 エリプタ30 吸入用、チエナム点滴静注用0.5g

2月の区分変更薬品（常備薬品→院外専用薬品）

ジゴキシン錠0.125mg「AFP」、ツムラ人参養栄湯エキス顆粒、トリプタノール錠25、MS温シップ「タイホウ」、ボルタレンサボ50mg

2月の削除薬品

ニバジール錠2mg、プリモボラン錠5mg、ホスミン錠500

