



薬剤部



～情報～

2020年1月



12月の採用薬品

生理食塩液「ヒカリ」100mL (細口開栓型)

生理食塩液

光製薬

【効】

1. 細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時
2. 注射剤の溶解希釈剤
3. 皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
4. 医療用器具の洗浄

【用】 【副】 添付文書参照



12月の採用薬品 (特定個人薬)

ビーマス配合錠

緩下剤

日本臓器製薬

【効】便秘症

腹部臓器検査時又は手術前後の腸管内容物の排除

【用】通常成人1回5～6錠を就寝前、又は1日6錠を2～3回に分割して、多量の水とともに経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



トレリーフOD錠25mg

パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬 (レボドパ賦活剤)

大日本住友製薬

【効】 【用】本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。

(1) . パーキンソン病 (レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)

通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。なお、パーキンソン病における症状の日内変動 (wearing-off現象) の改善には、1日1回50mgを経口投与する。

(2) . レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム (レボドパ含有製剤通常、成人にゾニサミドとして、1日1回25mgを経口投与する。

【副】添付文書参照

12月の採用薬品 (院外専用薬)

ディレグラ配合錠

アレルギー性疾患治療剤

サノフィ

【効】アレルギー性鼻炎

【用】通常、成人及び12歳以上の小児には1回2錠 (フェキソフェナジン塩酸塩として60mg及び塩酸ブソイドエフェドリンとして120mg) を1日2回、朝及び夕の空腹時に経口投与する。

【副】添付文書参照



ノウリアスト錠20mg

アデノシンA2A受容体拮抗薬

協和キリン

【効】レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるウェアリングオフ現象の改善

【用】本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。通常、成人にはイストラデフィリンとして20mgを1日1回経口投与する。なお、症状により40mgを1日1回経口投与できる。

【副】添付文書参照



ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」

統合失調症治療剤

長生堂製薬

【効】統合失調症

【用】ゾテピンとして、通常成人1日75～150mgを分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが1日450mgまで増量することができる。

【副】添付文書参照



削除薬品の取り消し

グルカゴンGノボ注射用1mg、デパケンR錠200mg

★市場流通状況による処方制限 (オーダ入力不可 : 期間未定)

レビトラ錠10mg (多くの保険薬局で入手困難となっているため)

