

1月の採用薬品（特定個人薬）

オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」
持続性ソマトスタチンアナログ製剤

あすか製薬

【効】

1. 下記疾患に伴う諸症状の改善：
消化管ホルモン産生腫瘍（VIP産生腫瘍、カルチノイド症候群の特徴を示すカルチノイド腫瘍、ガストリン産生腫瘍）
2. 下記疾患における成長ホルモン、ソマトメジン-C分泌過剰状態及び諸症状の改善：
先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置、他剤による治療で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合）
3. 進行・再発癌患者の緩和医療における消化管閉塞に伴う消化器症状の改善

【用】

1. 消化管ホルモン産生腫瘍、先端巨大症・下垂体性巨人症の場合：
通常、成人にはオクトレオチドとして1日量100又は150 μ gより投与をはじめ、効果が不十分な場合は1日量300 μ gまで漸増し、2～3回に分けて皮下投与する。なお、症状により適宜増減する。
2. 進行・再発癌患者の緩和医療における消化管閉塞に伴う消化器症状の場合：
通常、成人にはオクトレオチドとして1日量300 μ gを24時間持続皮下投与する。なお、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

漢方製剤

ツムラ

【効】悪寒、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症
感冒、気管支炎

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



1月の採用薬品（院外専用薬）

アジレクト錠1mg
パーキンソン病治療剤

武田薬品工業

【効】パーキンソン病

【用】通常、成人にはラサギリンとして1mgを1日1回経口投与する。

【副】添付文書参照

