



5月の採用薬品（特定個人薬）

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）

漢方製剤

ツムラ

【効】病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
 【用】通常、成人1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
 【副】添付文書参照



5月の採用薬品（院外処方専用薬品）

シングレアチュアブル錠5mg

気管支喘息治療剤

MSD

【効】気管支喘息
 【用】通常、6歳以上の小児にはモンテルカストとして5mgを1日1回就寝前に経口投与する。
 用法用量に関連する使用上の注意
 1. 本剤は、口中で溶かすか、かみくだいて服用すること。
 2. モンテルカストチュアブル錠はモンテルカストフィルムコーティング錠と生物学的に同等でなく、モンテルカストチュアブル錠はモンテルカストフィルムコーティング錠と比較してバイオアベイラビリティが高いため、モンテルカストチュアブル錠5mgとモンテルカストフィルムコーティング錠5mgをそれぞれ相互に代用しないこと。
 【副】添付文書参照

シングレアチュアブル錠は
チェリー風味の味がします



クロモグリク酸Na点眼液2%「トローワ」

アレルギー性結膜炎治療剤

東和薬品

【効】春季カタル、アレルギー性結膜炎
 【用】1回1～2滴、1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）点眼
 【副】添付文書参照



採用区分変更薬品

アザルフィジンE錠500mg	一般採用	→	院外限定
ゾーミックRM	一般採用	→	院外限定
アスピリンシロップ0.5%	一般採用	→	院外限定
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用	一般採用	→	院外限定
SM配合散	一般採用	→	院外限定



チュアブル錠とは

噛み砕いてから服用する錠剤。水なしでも服用できますが、水で飲んでも問題ありません。シングレアチュアブル錠は噛まないで飲みこんでも、数分で体内で溶けるので特に問題はありますが、噛まないでそのまま服用すると溶けにくく、なかなか吸収されないことがある薬もあるので注意が必要です。

その他の錠剤の剤形の特徴

OD錠は、口腔内で速やかに唾液で崩壊するため、噛まずに水なしでも服用できる錠剤。水で飲んでも問題ありません。

《例》ランソプラゾールOD錠、アムロジピンOD錠

腸溶錠は、胃酸による効果の低下や胃腸障害を防ぐため、腸で吸収され効果が出るように、胃で溶けずに腸で溶けるように工夫されている錠剤。

《例》オメプラール錠、バイアスピリン錠

徐放錠は、薬がゆっくり溶け出し、効果が長く続くよう工夫されている錠剤。効果の持続時間を長くすることで服用回数を減らすことができます。噛んだり砕いたりすると、薬が急に放出されて効果が強く現れることがあります。

《例》ニフェジピンCR錠、ユニフィルA錠

糖衣錠・フィルムコーティング錠は、錠剤の周りを糖やフィルムで覆うことで薬の苦みや臭いを隠し、飲みやすくした錠剤。また光や湿気から薬を守り、安定性が増す場合もあります。《例》メチコバル錠、レボフロキサシン錠

舌下錠は、舌の下で溶かして薬を吸収させる錠剤。口腔粘膜から直接吸収されるので速やかに効果が現れます。

《例》ニトロペン舌下錠

トローチは、口腔、咽頭などの粘膜の殺菌、収斂などの作用を目的として、唾液で徐々に溶けるように硬く作られている錠剤。噛まない方が効果が持続します。

《例》SPTローチ

バッカル錠は、舌下または歯茎と頬の間に挟んで、唾液でゆっくり溶かし、口の中の粘膜から薬を吸収させる錠剤。

《例》アズノールST錠口腔用