



薬剤部

～情報～

2020年9月



8月の採用薬品、削除薬品はありません。

■DPP-4阻害薬(配合剤を除く)について簡単にまとめました。参照:添付文書(当センター採用薬)

商品名	ジャヌビア錠50mg グラクティブ錠 	エクア錠50mg 	ネシーナ錠 	トラゼンタ錠 5mg (注文薬品) 	テネリア錠 	スイニー錠 	オングリザ錠 	ザファテック錠 100mg (院外専用薬品) 	マリゼブ錠 
一般名	シタグリブチンリン酸塩水和物	ビルダグリブチン	アログリブチン安息香酸塩	リナグリブチン	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	アナグリブチン	サキサグリブチン水和物	トレラグリブチンコハク酸塩	オマリグリブチン
効能効果	2 型 糖 尿 病								
用法用量	1日1回50mg 1日1回100mgまで	1回50mg1日2回(朝夕)又は 1日1回50mg(朝)	1日1回25mg	1日1回5mg	1日1回20mg 1日1回40mgまで	1回100mg1日2回(朝夕) 1回200mg1日2回まで	1日1回5mg 1日1回2.5mgも可	1週間に1回100mg 服用を忘れた場合は、気づいた時点で1回分を服用、その後はあらかじめ定められた曜日に服用。同日中に2回分服用しないこと。	1週間に1回25mg
腎機能障害患者への用法用量	Ccr30～50 男性Cr1.5～2.5 女性Cr1.3～2.0 1日1回25mg 最大1日1回50mg Ccr<30 男性Cr>2.5 女性Cr>2.0 1日1回12.5mg 最大1日1回25mg 末期腎不全患者 血液透析との時間関係は問わない	中等度以上の腎機能障害患者、透析中の末期腎不全患者 1日1回50mg(朝)	Ccr30～50 男性Cr1.4～2.4 女性Cr1.2～2.0 1日1回12.5mg Ccr<30 男性Cr>2.4 女性Cr>2.0 1日1回6.25mg	記載なし	記載なし	Ccr<30 男性Cr>2.4 女性Cr>2.0 1日1回100mg	Ccr<50 男性Cr>1.4 女性Cr>1.2 1日1回2.5mg	Ccr30～50 男性Cr1.4～2.4 女性Cr1.2～2.0 1週間に1回50mg Ccr<30 男性Cr>2.4 女性Cr>2.0 1週間に1回25mg	eGFR<30 男性:Cr>1.9 女性:Cr>1.4 1週間に1回12.5mg
肝機能障害患者への用法用量	記載なし	重度肝機能障害患者は禁忌 軽度及び中等度障害患者は慎重投与	軽度～中等度肝機能障害患者では用量調節必要なし	記載なし	高度肝機能障害患者での臨床経験はない	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
重大な副作用	低血糖、急性膵炎、腸閉塞、類天疱瘡								
	アナフィラキシー反応、皮膚粘膜眼症候群、剥脱性皮膚炎、肝機能障害、黄疸、急性腎障害、間質性肺炎、横紋筋融解症、血小板減少	肝炎、肝機能障害、血管浮腫、横紋筋融解症、間質性肺炎	肝機能障害、黄疸、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、横紋筋融解症、間質性肺炎	肝機能障害、間質性肺炎	肝機能障害、間質性肺炎		過敏症反応		