



12月の採用薬品（院外処方専用薬品）

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤 ノボノルディスクファーマ



【効】インスリン療法が適応となる2型糖尿病
 【用】通常、成人では、初期は1日1回10ドーズ（インスリンノリラグルチドとして10単位/0.36mg）を皮下注射する。投与量は患者の状態に応じて適宜増減するが、1日50ドーズ（インスリンデグルデクノリラグルチドとして50単位/1.8mg）を超えないこと。注射時刻は原則として毎日一定とする。なお、本剤の用量単位である1ドーズには、インスリンデグルデク1単位及びノリラグルチド0.036mgが含まれる。

【副】添付文書参照

ミネプロ錠2.5mg

選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

第一三共



【効】高血圧症
 【用】通常、成人にはエサキセレンオンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合は、5mgまで増量することができる。

【副】添付文書参照

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」

痛風・家族性地中海熱治療剤

高田製薬



【効】痛風発作の緩解及び予防、家族性地中海熱

【用】 【副】添付文書参照

12月の採用薬品（特定個人薬品）

フラジール錠250mg

抗トリコモナス剤

富士製薬工業



【効】 【用】
 1. トリコモナス膣炎：通常、成人にはメトロニダゾールとして、1クールとして、1日1回250mgを10～14日間膣内に挿入する。
 2. 細菌性膣症：通常、成人にはメトロニダゾールとして、1日1回250mgを7～10日間膣内に挿入する。

【副】添付文書参照



ジェネリック医薬品への切り換え薬品

リリカOD錠25mg → プレガバリンOD錠25mg 「ファイザー」



リリカOD錠75mg → プレガバリンOD錠75mg 「ファイザー」



採用区分変更薬品

マーロックス懸濁用配合顆粒 採用薬 → 院外専用薬品



名称変更薬品

デキサルチン口腔用軟膏1mg/g → デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「NK」



お知らせ

小林化工株式会社の製品について

イトラコナゾール錠50「MEEK」の一部ロットにベンゾジアゼピン系睡眠剤であるリルマザホン塩酸塩水和物（リスミー）の通常臨床量を超える成分量混入が判明し、クラスIの回収となっています。当センターでは2019年4月以降、イトラコナゾールの院外、院内処方歴なく直接の問題はありません。しかし、一部の小林化工株式会社製品について出荷停止となっている薬剤もあるため、今後の入荷に影響が出てくる可能性もあります。

プロクトセディル坐薬（痔治療剤）について

メーカーよりプロクトセディル坐薬が自主回収及び出荷停止となったため、現在、院内、院外ともに処方できなくなっています。

