



2月の採用薬品

ブドウ糖「日医工」

糖類剤

日医工



白色の結晶

【効・用】《経口的栄養補給》

必要量を粉末あるいは水溶液として経口投与する。なお、年齢、体重により適宜増減する。

《ブドウ糖負荷試験》

通常成人1回ブドウ糖として50～100gを経口投与する。なお、年齢、体重により適宜増減する。

【副】悪心・嘔吐、下痢、腹痛

※低血糖時の対応のため、メーカー提供分がなくなっているからの切り換え

2月の採用薬品（院外処方専用薬品）

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒

漢方製剤

ツムラ



【効】疲労、倦怠感著しく、尿利減少または頻数、口渴し、手足に交互的に冷感と熱感のあるものの次の諸症：

腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ザーネ軟膏0.5%

外用ビタミンA剤

サンノーバ

【効】角化性皮膚疾患（尋常性魚鱗癬、毛孔性苔癬、単純性皰糠疹）

【用】1日2～3回患部に塗擦する。

【副】添付文書参照

お知らせ

現在、トリノシン顆粒10%は供給一時停止となっており、在庫も無いことより処方オーダーできません。ご協力よろしくお願いします。

2月の採用薬品（特定個人薬品）

ソタコール錠40mg

不整脈治療剤

アスペンジャパン



【効】生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合：

心室頻拍、心室細動

【用】通常、成人にはソタロール塩酸塩として1日80mgから投与を開始し、効果が不十分な場合は1日320mgまで漸増し、1日2回に分けて経口投与する。

【副】添付文書参照

販売名変更

スミルスチック3% → フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」

スミルローション3% → フェルビナクローション3%「三笠」

アフタシル25μg → トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」

ビーソフテンローション0.3% → ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」

イオベリン350注シリンジ100mL → イオヘキソール350注シリンジ100mL「FF」

採用区分変更薬品

耐性乳酸菌散10%「JG」	常備薬品	→	採用中止
ガスロンN・OD錠4mg	常備薬品	→	院外専用薬品
ペルサンチン錠25mg	常備薬品	→	院外専用薬品
イトリゾールカプセル50	常備薬品	→	院外専用薬品
スージャヌ配合錠	常備薬品	→	院外専用薬品
アクトス錠30	常備薬品	→	ピオグリタゾン錠30mg
「武田デバ」（ジェネリック医薬品）へ変更し、院外専用薬品			

採用薬変更

リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」	→	「ヨシトミ」に変更
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」	→	「トーフ」に変更
セレスターナ配合錠	→	ベタセレミン配合錠

