



12月の採用薬品 (特定個人薬品から変更)

デヒゴ錠 5mg

不眠症治療剤

エーザイ

【効】不眠症

【用】通常、成人にはレンボレキサントとして1日1回5mgを就寝直前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日1回10mgを超えないこととする。

【副】添付文書参照

12月の採用薬品 (院外処方専用薬品)

セロケン錠 20mg

高血圧・狭心症・不整脈治療剤

アストラゼネカ

【効】 【用】

1. 本態性高血圧症(軽症～中等症) :

通常、成人にはメトプロロール酒石酸塩として1日60～120mgを1日3回に分割経口投与する。効果不十分な場合は240mgまで増量することができる。なお、年齢、症状により適宜増減する。

2. 狭心症、頻脈性不整脈 :

通常、成人にはメトプロロール酒石酸塩として1日60～120mgを1日2～3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



採用メーカー変更薬品 (出荷停止のため)

クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」 → クラリシッド錠200mg
【先発品】

後発医薬品への変更

パタノール点眼液0.1% → オロパタジン点眼液0.1%「サンド」

採用区分変更薬品

エバミール錠 1.0 採用薬品 → 院外専用薬品

12月の採用薬品 (特定個人薬品)

アダプチノール錠 5mg


暗順応改善剤

バイエル薬品

【効】網膜色素変性症における一時的な視野・暗順応の改善

【用】ヘレニエンとして、通常成人1回5mgを1日2～4回経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒

漢方製剤

ツムラ

【効】夜泣き、ひきつけ

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ツムラ四物湯エキス顆粒

漢方製剤

ツムラ

【効】皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒

漢方製剤

ツムラ

【効】腹部膨満感のある次の諸症：

しぶり腹、腹痛

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

