



# 薬剤部 ～情報～

2022年4月



## 3月の採用薬品（院外処方専用薬品）

### セファランチン錠1mg 白血球減少症、脱毛等治療剤 化研生薬



【効】【用】  
放射線による白血球減少症  
通常成人には、タマサキツツラフジ抽出アルカロイドとして、1日3～6mgを2～3回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。  
円形脱毛症・粧糠性脱毛症  
通常成人には、タマサキツツラフジ抽出アルカロイドとして、1日1.5～2mgを2～3回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

### タグリッソ錠40mg 抗悪性腫瘍剤 アストラゼネカ



【効】EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌  
【用】通常、成人にはオシメルチニブとして80mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

【副】添付文書参照

## 3月の採用薬品（特定個人薬品）

### シンボニー皮下注50mgオートインジェクター ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 ヤンセンファーマ



【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）  
中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）

【用】【副】添付文書参照

## ◆当センター採用の抗アレルギー点眼・点鼻液についてまとめました。

成分名	商品名	採用区分	1日点眼回数	保存	OTC	特徴
オロパタジン塩酸塩	オロパタジン点眼液0.1% 【先発薬】パタノール		4回	遮光室温		膜安定化作用と抗ヒスタミン作用をもつ
クロモグリク酸ナトリウム	クロモグリク酸Na点眼液2% 【先発薬】インタール	院外	4回	室温	○	最も古くから用いられており、安全性、有効性が確立している
ケトチフェンフマル酸塩	ケトチフェン点眼液0.05% 【先発薬】ザジテン	院外	4回	室温	○	抗ヒスタミン作用をもつ、点眼時にやや刺激強い
トラニラスト	リザベン点眼液0.5%	院外	4回	遮光室温	○	線維芽細胞抑制作用があり、結膜濾胞の縮小が期待できる

成分名	商品名	適応症	用法用量	特徴
フルチカゾンフランカルボン酸エステル	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	アレルギー性鼻炎	成人：1日1回各鼻腔に2噴霧 小児：1日1回各鼻腔に1噴霧	フルチカゾン®比°の酸エステルより効果の発現が早い 使用前に上下に振盪
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用 【先発薬】ナゾネックス	アレルギー性鼻炎	成人,12歳以上：1日1回各鼻腔に2噴霧 12歳未満：1日1回各鼻腔に1噴霧	特異な臭いあり懸濁液のため使用前に上下に振盪