



7月の採用薬品

レボフロキサシン点眼液 1.5% 「VTRS」

広範囲抗菌点眼剤

ヴィアトリス製薬



【効】 <適応菌種> :

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、マイクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュドモナス属、緑膿菌、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、アクネ菌

<適応症> :

眼瞼炎、涙のう炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科周術期の無菌化療法

【用】通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

フルマゼニル注射液 0.5mg 「ニプロ」

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

ニプロ



【効】ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静の解除及び呼吸抑制の改善

【用】通常、初回0.2mgを緩徐に静脈内投与する。投与後4分以内に望まれる覚醒状態が得られない場合は更に0.1mgを追加投与する。

以後必要に応じて、1分間隔で0.1mgずつを総投与量1mgまで、ICU領域では2mgまで投与を繰り返す。ただし、ベンゾジアゼピン系薬剤の投与状況及び患者の状態により適宜増減する。

【副】添付文書参照



6月の採用薬品（注文薬品）

ノイアート静注用 1500単位

血液凝固阻止剤

一般社団法人日本血液製剤機構



【効】先天性アンチトロンビンⅢ欠乏に基づく血栓形成傾向
アンチトロンビンⅢ低下を伴う汎発性血管内凝固症候群（DIC）

【用】 【副】添付文書参照

7月の採用薬品（特定個人薬品）

デベルザ錠 20mg

2型糖尿病治療剤

興和株式会社



【効】2型糖尿病

【用】通常、成人にはトホグリフロジンとして20mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。

【副】添付文書参照

エンタカポン錠 100mg 「トーフ」

末梢COMT阻害剤

東和薬品



【効】レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off現象）の改善

【用】本剤は単独では使用せず、必ずレボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩と併用する。

通常、成人にはエンタカポンとして1回100mgを経口投与する。なお、症状によりエンタカポンとして1回200mgを投与することができる。

【副】添付文書参照

ギャバロン髄注 0.2%、0.05%

抗痙縮剤

第一三共



【効】脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺（既存治療で効果不十分な場合に限り）

【用】 【副】添付文書参照



採用区分変更

ラゲブリオカプセル 200mg

タガメット錠 200mg

ボルタレンSRカプセル 37.5mg

レボフロキサシン点眼液 0.5% 「VTRS」

コムタン錠 100mg

特定個人薬 → 採用薬品

採用薬品 → 院外専用薬品

採用薬品 → 院外専用薬品

採用薬品 → 削除

院外専用薬品 → 削除