



# 薬剤部

# ～情報～

## 2024年4月



### 3月の採用薬品

#### エンレスト錠 100mg

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

ノバルティスファーマ



【効】 【用】

<慢性心不全>：通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2～4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし、いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。

<高血圧症>：通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回200mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、最大投与量は1回400mgを1日1回とする。

【副】添付文書参照

#### L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「サワイ」

Caアスパルテート製剤

沢井製薬



【効】○低カルシウム血症に起因する下記症候の改善：

テタニー、テタニー関連症状

○下記代謝性骨疾患におけるカルシウム補給：

骨粗鬆症、骨軟化症

○発育期におけるカルシウム補給、妊娠・授乳時におけるカルシウム補給

【用】アスパラギン酸カルシウムとして、通常成人1日1.2gを2～3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

※販売停止のため、アスパラCA錠200より採用変更

#### ポリフル錠 500mg

過敏性腸症候群治療剤

ヴィアトリス製薬



【効】過敏性腸症候群における便通異常（下痢、便秘）及び消化器症状

【用】通常、成人にはポリカルボフィルカルシウムとして1日量1.5～3.0gを3回に分けて、食後に水とともに経口投与する。

【副】添付文書参照

※販売停止のためコロネル錠500mgより採用変更

### 3月の採用薬品（特定個人薬品）

#### ニコリンH注射液 0.5g

意識障害改善剤

武田テバ薬品



【効】 【用】 【副】添付文書参照

#### ブイフェンド 200mg 静注用

深在性真菌症治療剤

ファイザー



【効】 【用】 【副】添付文書参照

### 3月の採用薬品（特定個人薬品）

#### アデホスコーフ腸溶錠 20

代謝賦活剤

興和株式会社



【効】 【用】 【副】添付文書参照

#### ゾラデックス 3.6mg デボ

LH-RHアゴニスト

アストラゼネカ



【効】 【用】 【副】添付文書参照

### 採用薬品のメーカー変更

プレガバリンOD錠 25mg, 75mg「ファイザー」 → 「VTRS」

セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」 → 「VTRS」

### 削除薬品

アスパラ-Ca錠 200、L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「トーワ」

コロネル錠 500mg

### お知らせ

★時間外緊急処方の運用開始について

薬剤部処方箋受付時間（平日8時15分から16時30分）以外で、緊急的に内服（外用）薬が必要な際は、『時間外緊急処方』で処方入力することに運用が変更となりました。

