



1月の採用薬品

ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」

経皮鎮痛消炎剤

東光薬品工業株式会社



【効】下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎

変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘等）、筋肉痛（筋・筋膜性腰痛症等）、外傷後の腫脹・疼痛

【用】症状により、適量を1日数回患部に塗擦する。

【副】添付文書参照

※同一成分のジクロフェナクNaゲル1%「NIG」が販売停止のため

1月の採用薬品（限定採用薬品）

フシジンレオ軟膏2%

抗生物質製剤

アルフレッサ ファーマ株式会社



【効】

<適応菌種>

本剤に感性のブドウ球菌属

<適応症>

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染【用】症状により、適量を1日数回患部に塗擦する。

【用】患部を清潔にした後1日数回適量を直接患部に塗布するかまたは無菌ガーゼに延ばして貼付する。

【副】添付文書参照

ミニリンメルトOD錠60μg

ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

フェリング・ファーマ株式会社



【効】中枢性尿崩症

【用】通常、デスモプレシンとして1回60～120μgを1日1～3回経口投与する。投与量は患者の飲水量、尿量、尿比重、尿浸透圧により適宜増減するが、1回投与量は240μgまでとし、1日投与量は720μgを超えないこと。

【副】添付文書参照

1月の採用薬品（限定採用薬品）

ポリコナゾール錠50mg「トーワ」

深在性真菌症治療剤

東和薬品株式会社



【効】○下記の重症又は難治性真菌感染症

・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症

・カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症

・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症

・フサリウム症

・スケドスポリウム症

○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

【用】成人（体重40kg以上）：通常、ポリコナゾールとして初日は1回300mgを1日2回、2日目以降は1回150mg又は1回200mgを1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には、増量できるが、初日投与量の上限は1回400mg 1日2回、2日目以降投与量の上限は1回300mg 1日2回までとする。

成人（体重40kg未満）：通常、ポリコナゾールとして初日は1回150mgを1日2回、2日目以降は1回100mgを1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には2日目以降の投与量を1回150mg 1日2回まで増量できる。

（小児の用法、用量は添付文書参照）

【副】添付文書参照

タダラフィル錠20mgAD「T E」

ホスホジエステラーゼ5阻害剤

トーアエイヨー株式会社



【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】通常、成人には1日1回タダラフィルとして40mgを経口投与する。

【副】添付文書参照

一部医薬品の供給低下、供給停止のお知らせ

- 大塚生食注2ポート100mLは供給低下により、入荷困難となっているため、一時オーダ不可となっています。（代替薬：大塚生食注100mL）
- セファクロルカプセル250mg「SW」は、供給停止により、院内在庫消尽したため、オーダ不可となっています。（代替薬：メイアクトMS錠100mgなど）。

