



## 2月の採用薬品

### エフィエント錠3.75mg (特定個人薬)

#### 第一三共 抗血小板剤



【効】経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される  
 下記の虚血性心疾患：  
 急性冠症候群（不安定狭心症，非ST上昇心筋梗塞，ST上昇心筋梗塞）  
 安定狭心症，陳旧性心筋梗塞  
 【用】通常，成人には，投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し，その後，維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。  
 【副】皮下出血，鼻出血，血尿，血管穿刺部位血腫及び皮下血腫，肝機能障害等

## 2月の採用薬品（院外処方専用薬）

### ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒2.5g/包

#### ツムラ 漢方製剤

【効】体格はしっかりしていて赤ら顔が多く，腹部は大体充実，下腹部に抵抗のあるものの次の諸症  
 子宮並びにその付属器の炎症，子宮内膜炎，月経不順，月経困難，帯下，更年期障害，冷え症，腹膜炎，打撲症，痔疾患，睾丸炎  
 【用】通常，成人1日7.5gを2～3回に分割し，食前又は食間に経口投与する。

### クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒

#### クラシエ 漢方製剤

【効】関節痛，神経痛  
 【用】通常，成人1日7.5gを2～3回に分割し，食前又は食間に経口投与する。

### ツムラ十全大補湯エキス顆粒2.5g/包

#### ツムラ 漢方製剤

【効】病後の体力低下，疲労倦怠，食欲不振，ねあせ，手足の冷え，貧血  
 【用】通常，成人1日7.5gを2～3回に分割し，食前又は食間に経口投与する。

### ベガモックス点眼液0.5%

#### ノバルティスファーマ 広範囲抗菌点眼剤

【効・用】眼瞼炎，涙のう炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎：通常，1回1滴，1日3回点眼する。  
 眼科周術期の無菌化療法：通常，手術前は1回1滴，1日5回，手術後は1回1滴，1日3回点眼する。

### フロリードゲル経口用2%

#### 持田製薬 口腔・食道カンジダ症治療剤

【効】口腔カンジダ症，食道カンジダ症  
 【用】添付文書参照

### テグレートール錠100mg

#### サンファーマ 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

【効】 1. 精神運動発作，てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害，てんかんの痙攣発作：強直間代発作（全般痙攣発作，大発作）  
 2. 躁病，躁うつ病の躁状態，統合失調症の興奮状態  
 3. 三叉神経痛  
 【用】カルバマゼピンとして通常，成人には最初1日量200～400mgを1～2回に分割経口投与し，至適効果が得られるまで（通常1日600mg）徐々に増量する。

### ピーエイ配合錠

#### 全星薬品工業 感冒剤

【効】感冒もしくは上気道炎に伴う下記症状の改善及び緩和：  
 鼻汁，鼻閉，咽・喉頭痛，頭痛，関節痛，筋肉痛，発熱  
 【用】通常，成人には1回2錠を1日4回経口投与する。

### タミフルドライシロップ3%

#### 中外製薬 抗インフルエンザウイルス剤

【効】A型又はB型インフルエンザウイルス感染症及びその予防  
 【用】添付文書参照

2月の削除薬品：なし

