



薬剤部 ～情報～

2025年11月



10月の採用薬品

ラゲブリオ錠400mg

抗ウイルス剤

MSD株式会社

【効】SARS-CoV-2による感染症

【用】通常、18歳以上の患者には、モルヌピラビルとして1回800mgを1日2回、5日間経口投与する。

【副】添付文書参照



10月の採用薬品（限定採用薬品）

エフィエント錠2.5mg

抗血小板剤

第一三共株式会社

【効】【用】

＜経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患＞

通常、成人には、投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。

＜虚血性脳血管障害（大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う）後の再発抑制＞

通常、成人には、プラスグレルとして3.75mgを1日1回経口投与する。

【副】添付文書参照



アリドネパッチ27.5mg

アルツハイマー型認知症治療剤

帝國製薬株式会社

【効】アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

【用】通常、軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者にはドネペジルとして、1日1回27.5mgを貼付する。高度のアルツハイマー型認知症患者にはドネペジルとして、27.5mgで4週間以上経過後、55mgに増量する。なお、症状により1日1回27.5mgに減量できる。

本剤は背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。

【副】添付文書参照



10月の削除薬品：

ラコールNF配合経腸用半固形剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タレハ」（温感タイプ）

10月の採用薬品（限定採用薬品）

トラディアンス配合錠AP

2型糖尿病治療剤

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

【効】2型糖尿病

ただし、エンパグリフロジン及びリナグリプチンの併用による治療が適切と判断される場合に限る。

【用】通常、成人には1日1回1錠（エンパグリフロジン／リナグリプチンとして10mg／5mg又は25mg／5mg）を朝食前又は朝食後に経口投与する。

【副】添付文書参照



ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



タクロリムスカプセル1mg「VTRS」

免疫抑制剤

ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

【効】

○下記の臓器移植における拒絶反応の抑制

腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植

○骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制

○重症筋無力症

○関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）

○ループス腎炎（ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合）

○難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等症～重症に限る）

○多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎

【用】【副】添付文書参照

