



# 薬剤部

# ～情報～

2025年12月



## 11月の採用薬品

### プラリアH.I.皮下注60mgシリンジ0.5mL ヒト型抗RANKモノクローナル抗体製剤

第一三共株式会社

【効】 【用】

<骨粗鬆症>

通常、成人にはデノスマブ（遺伝子組換え）として60mgを6カ月に1回、皮下投与する。

<関節リウマチに伴う骨びらんの進行抑制>

通常、成人にはデノスマブ（遺伝子組換え）として60mgを6カ月に1回、皮下投与する。なお、6カ月に1回の投与においても、骨びらんの進行が認められる場合には、3カ月に1回、皮下投与することができる。

【副】添付文書参照



### ソリターティ1号輸液500mL

開始液

エイワイファーマ株式会社

【効】

○脱水症及び病態不明時の水分・電解質の初期補給

○手術前後の水分・電解質の補給

【用】通常成人、1回500～1000mLを点滴静注する。投与速度は通常成人1時間当たり300～500mL、小児の場合、1時間当たり50～100mLとする。

なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

【副】添付文書参照



### BDマイクロファインプロ 32G×4mm

ペン型注入器用注射針

エムバクタ合同会社

BDマイクロファインプラス 32G×4mmより切り替え

## 11月の削除薬品：

プラリア皮下注60mg シリンジ

YDソリターティ1号輸液（在庫消尽次第削除）

スルペリン注250mg「N.P」（経過措置期限切れ）

アイミクス配合錠HD

リポバス錠5



## 11月の採用薬品（限定採用薬品）

### ツムラ荘芥連翹湯エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ



【効】 蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



### ツムラ七物降下湯エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ



【効】身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症：

高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重）


【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

### コタロー黄連解毒湯エキスカプセル

漢方製剤

小太郎漢方製薬



【効】比較的体力があり、のぼせぎみで顔色赤く、いろいろする傾向のある次の諸症：

鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症

【用】通常、成人1日6カプセル（2.16g）を2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

### イルアミクス配合錠HD「D S P B」（イバサルタン100mg／アムジピン10mg）

長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

住友ファーマプロモ株式会社



【効】高血圧症

【用】通常、成人には1日1回1錠を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

【副】添付文書参照