



## 2月の採用薬品

### リボトリール細粒0.1%

#### 抗てんかん剤

#### バイエル薬品

【効】○小型（運動）発作〔ミオクロニー発作、失立（無動）発作、點頭てんかん（幼児けい縮発作、BNSけいれん等）〕

○精神運動発作

○自律神経発作

【用】通常 成人、小児は、初回量クロナゼパムとして、1日0.5～1mgを1～3回に分けて経口投与する。以後、症状に応じて至適効果が得られるまで徐々に増量する。通常、維持量はクロナゼパムとして1日2～6mgを1～3回に分けて経口投与する。乳、幼児は、初回量クロナゼパムとして、1日体重1kgあたり0.025mgを1～3回に分けて経口投与する。以後、症状に応じて至適効果が得られるまで徐々に増量する。通常、維持量はクロナゼパムとして1日体重1kgあたり0.1mgを1～3回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。

【副】添付文書参照

### ランドセン細粒0.1%（同成分）販売中止のため切り替え

### ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」

#### 角結膜上皮障害治療用点眼剤

#### 千寿製薬

【効】下記疾患に伴う角結膜上皮障害：

○シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群（ドライアイ）等の内因性疾患

○術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による外因性疾患

【用】1回1滴、1日5～6回点眼し、症状により適宜増減する。なお、通常は0.1%製剤を投与し、重症疾患等で効果不十分の場合には、0.3%製剤を投与する。

【副】添付文書参照

### ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%（同成分）「トーフ」販売中止のため切り替え

### プレバナー20水性懸濁注

#### 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

#### （無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

#### ファイザー株式会社

【効】【用】【副】添付文書参照



## 2月の採用薬品

### イソビスト注240

#### 非イオン性脳槽・脊髄・関節造影剤

#### バイエル薬品

【効】【用】【副】添付文書参照

## 2月の採用薬品（限定採用薬品）

### アウイクリ注フレックスタッチ 総量300単位

#### 週1回持効型溶解インスリンアナログ製剤

#### ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病

【用】【副】添付文書参照

### ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒

#### 漢方製剤

#### 株式会社ツムラ

【効】比較的体力のない人で、腹部膨満し、

腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うものの次の諸症：

1. 急性腸炎、大腸カタル
2. 常習便秘、宿便、しぶり腹

【用】【副】添付文書参照

### ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

#### 漢方製剤

#### 株式会社ツムラ

【効】虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：

神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症

【用】【副】添付文書参照

## 2月の削除薬品：

アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入、MS冷シップ「タイホウ」、ザジテンカプセル1mg EPLカプセル250mg、ランドセン細粒0.1%、ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーフ」 スポンゼル5cm×2.5cm

## 採用区分変更薬品

### ①通常薬品 → 注文薬品

バルサルタンOD錠80mg「トーフ」、ピオグリタゾン錠30mg「武田デバ」、リボトリール細粒0.1%

### ②通常薬品 → 限定薬品

パルモディア錠0.1mg

