



## 2月の採用薬品

### ジゴシン注0.25mg

ジギタリス配糖体製剤

太陽ファルマ

【効】

○次の疾患に基づくうっ血性心不全（肺水腫、心臓喘息等を含む）：  
先天性心疾患、弁膜疾患、高血圧症、虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症等）、  
肺性心（肺血栓・塞栓症、肺気腫、肺線維症等によるもの）、その他の心疾  
患（心膜炎、心筋疾患等）、腎疾患、甲状腺機能亢進症ならびに低下症等

○心房細動・粗動による頻脈

○発作性上室性頻拍

○次の際における心不全及び各種頻脈の予防と治療：

手術、急性熱性疾患、出産、ショック、急性中毒

【用】 【副】 添付文書参照



## 2月の採用薬品（院外専用薬品）

### ツイミーグ錠500mg

糖尿病用剤

住友ファーマ

【効】 【用】 【副】 添付文書参照



## 2月の採用薬品（特定個人薬品）

### オプスミット錠10mg

エンドセリン受容体拮抗薬

ヤンセンファーマ

【効】 肺動脈性肺高血圧症

【用】 通常、成人には、マシテンタンとして10mgを1日1回経口投与す  
る。

【副】 添付文書参照



### アドシルカ錠20mg

ホスホジエステラーゼ5阻害剤

日本新薬

【効】 肺動脈性肺高血圧症

【用】 通常、成人には1日1回タダラフィルとして40mgを経口投与する。

【副】 添付文書参照



## 2月の採用薬品（特定個人薬品）

### ウプトラビ錠0.2mg

選択的PGI2受容体作動薬

日本新薬

【効】 ○肺動脈性肺高血圧症

○外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高  
血圧症

【用】 通常、成人にはセレキシパグとして1回0.2mgを1日2回食後経  
口投与から開始する。忍容性を確認しながら、7日以上の間隔で1回量とし  
て0.2mgずつ最大耐用量まで増量して維持用量を決定する。なお、最高  
用量は1回1.6mgとし、いずれの用量においても、1日2回食後に経口  
投与する。

【副】 添付文書参照



### ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」

不整脈治療剤

トーアエイヨー

【効】 生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又  
は使用できない場合：

心室頻拍、心室細動

【用】 【副】 添付文書参照



### ピリドキサル錠10mg「イセイ」

補酵素型ビタミンB6製剤

コーアイセイ

【効】 【用】 【副】 添付文書参照



### ロナセンテープ20mg

抗精神病剤

住友ファーマ

【効】 【用】 【副】 添付文書参照



### リーバクト配合顆粒

分岐鎖アミノ酸製剤

EAファーマ

【効】 【用】 【副】 添付文書参照

