



薬剤部

～情報～

2024年11月



10月の採用薬品

酢酸亜鉛錠 2.5mg 「ノーベル」 ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤 ダイト株式会社



- 【効】
○ウイルソン病（肝レンズ核変性症）
○低亜鉛血症
【用】 【副】 添付文書参照

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL 合成副腎皮質ホルモン剤 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社



- 【効】 【用】 【副】 添付文書参照

コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用 コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン ファイザー株式会社




- 【効】 SARS-CoV-2による感染症の予防
【用】 1回0.3mLを筋肉内に接種する
【副】 添付文書参照

ダイチロナ筋注 コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン 第一三共株式会社



- 【効】 SARS-CoV-2による感染症の予防
【用】 1回0.6mLを筋肉内に接種する。
【副】 添付文書参照



採用区分変更

ベルソムラ錠20mg

→ 限定採用薬品

10月の採用薬品（限定採用薬品）

ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 株式会社ツムラ



- 【効】 背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの
【用】 通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
【副】 添付文書参照

ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g 「明治」 アミノグリコシド系抗生物質 Meiji Seika ファルマ株式会社



- 【効】 <適応菌種>
ストレプトマイシンに感性のマイコバクテリウム属、ペスト菌、野兔病菌、ワイル病レプトスピラ
<適応症>
感染性心内膜炎（ベンジルペニシリン又はアンピシリンと併用の場合に限る）、ペスト、野兔病、肺結核及びその他の結核症、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症を含む非結核性抗酸菌症、ワイル病
【用】 【副】 添付文書参照

リベルサス錠 3mg 2型糖尿病治療剤 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社



- 【効】 2型糖尿病
【用】 通常、成人には、セマグルチド（遺伝子組換え）として1日1回7mgを維持用量とし経口投与する。ただし、1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量することができる。
【副】 添付文書参照

ミラベックスLA錠 1.5mg ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社



- 【効】 パーキンソン病
【用】 【副】 添付文書参照

一部抗菌剤の供給低下のお知らせ

ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ2g供給低下によりピペラシリンNa注射用2gに変更となりました。バッグ製剤→バイアル製剤への変更のため、溶解液（生食など）のオーダが必要となります。

セフジニル錠100mgは、供給停止により院内在庫残り15Capとなっております（現在の所、入荷の見込みはありません）。